



フルミスト[®]点鼻液の接種方法

フルミスト点鼻液は
こんなワクチンです

- ▶ 2～18歳の方を対象に、接種が1回で完了するワクチンです。
- ▶ 鼻へ噴霧するタイプのワクチンのため、針を刺す必要がありません。



Step
1

顔を上に向ける



はじめに、
フルミスト点鼻液（ワクチン）を
噴霧するために、顔を上に向けます。

Step
2

片方の鼻へ噴霧する



鼻の内側に噴霧器を置きます。
その後、フルミスト点鼻液（ワクチン）の
半分量である0.1mLを噴霧します。

Step
3

もう片方の鼻へ噴霧する



Step2と同じように、
もう片方の鼻の内側に噴霧器を置きます。
その後、残りのフルミスト点鼻液（ワクチン）
0.1mLを噴霧します。

これで、フルミスト点鼻液の
ワクチン接種は終了です。



Step2も3も、ワクチン接種後に、積極的に吸入する（鼻ですする）必要はありません。

フルミスト[®]点鼻液 接種後の注意



- フルミスト点鼻液の接種後30分間は、
ショック、アナフィラキシー（蕁麻疹、呼吸困難など）の
急な副反応が起こることがあります。
医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- 接種当日は、入浴しても差し支えありません。
- 接種当日は、いつも通りの生活をして構いませんが、
激しい運動は避けましょう。
- 接種後に熱が出ることがあります。
気になる場合は、医師にご相談ください。
（フルミストを接種したことを医師に伝えてください）
- フルミスト点鼻液の接種後1～2週間は、
重度の免疫不全者との密接な接触は避けてください。
- 医師が認めた場合は、フルミスト点鼻液と
他のワクチンも同時に接種することができます。
他のワクチン接種を希望される際は、医師にご相談ください。

